

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα κάτω...**πάνω!**



ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΣΤΥΣΗΣ



Κανένα φυτικό σκεύασμα ή συμπλήρωμα διατροφής δεν έχει αποδείξει ότι βοηθά τη στύση!



Όλα τα αποτελεσματικά φάρμακα χορηγούνται με ιατρική συνταγή.



Η μόνη ένδειξη είναι στυτική δυσλειτουργία οργανικής και ψυχογενούς αιτιολογίας. Στη 2η περίπτωση συνδυάζεται με θεραπεία από σεξολόγο



Κανένα από αυτά δεν είναι αφροδισιακό, δηλαδή δεν επηρεάζει την ερωτική διάθεση/επιθυμία



Όλα τα φάρμακα προκαλούν αγγειοδιαστολή και αύξηση της αιμάτωσης του πέους



Χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: σε χάπια και ενέσεις



ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ



ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ **ΕΛΛΑΔΑ** (όλα είναι σε μορφή δισκίου για λήψη από το στόμα)

ΒΑΡΔΕΝΑΦΙΛΗ
ΣΙΛΔΕΝΑΦΙΛΗ
ΤΑΔΑΛΑΦΙΛΗ

κυκλοφορεί και σε μορφή διαλυμένου, στο στόμα, δισκίου 10mg

κυκλοφορεί και σε 5mg δόση για καθημερινή λήψη ανεξάρτητα από την επαφή
Η ΜΟΡΦΗ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ 2 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Είναι απαραίτητη η **ΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ** για να προκληθεί στύση



άντρες με συχνές ερωτικές επαφές

μεγαλύτεροι άντρες που πάσχουν και από καλοήγη υπερπλασία προστάτη (η συχνότερη αιτία για προβλήματα ούρησης μετά τα 50 έτη).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ
Η ΛΗΨΗ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΔΥΣΠΕΨΙΑ
ΜΥΑΛΓΙΑ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΤΡΟΦΗ...

ΑΡΝΗΤΙΚΑ τη δράση της ΣΙΛΔΕΝΑΦΙΛΗΣ και της κλασικής μορφής ΒΑΡΔΕΝΑΦΙΛΗΣ
ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ όμως τη δράση της ΤΑΔΑΛΑΦΙΛΗΣ και της ΒΑΡΔΕΝΑΦΙΛΗΣ που απορροφάται από το στόμα



Η κοινωνική χρήση **αλκοόλ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ** τη δράση τους

ΟΙ ΕΝΔΟΠΕΪΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ



Χρησιμοποιούνται εδώ και **30 χρόνια**
Αποτελούν την πιο αποτελεσματική φαρμακευτική θεραπεία
Η ένεση γίνεται από τον ίδιο τον άντρα, κατόπιν εκπαίδευσης του από ουρολόγο, με ειδική σύριγγα και λεπτή βελόνη ινσουλίνης στα δύο πλάγια κατά μήκος του πέους



10 λεπτά μετά την ένεση προκαλείται στύση, ανεξάρτητα από ερωτική επιθυμία


Είναι **πρακτικά ανώδυνη και ιδιαίτερα ασφαλής θεραπεία**

Πολλά φάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, αλλά το πλέον διαδεδομένο παγκόσμια είναι ο συνδυασμός **ΠΑΠΑΒΕΡΙΝΗΣ, ΦΑΙΝΤΟΛΑΜΙΝΗΣ και ΑΛΠΡΟΣΤΑΔΙΛΗΣ (tri-mix)**

Το μόνο σκεύασμα που **συνταγογραφείται** είναι η **ΑΛΠΡΟΣΤΑΔΙΛΗ**



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΑΠΟΔΟΧΗ των ενέσεων

30-50%

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

- ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΣΤΥΣΗ (>4 ώρες χρειάζεται επείγουσα αντιμετώπιση)
- ΠΟΝΟΣ (αλγηροσταδιλη)

ΠΕΪΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ

Αποτελούν την **πιο παλιά μέθοδο αντιμετώπισης**

Έχει ένδειξη σε κάθε άντρα που έχει δοκιμάσει **ΑΝΕΠΙΤΥΧΩΣ** τις άλλες θεραπείες.

Υπάρχουν **2** τύποι προθέσεων:

ΟΙ **ΣΤΑΘΕΡΕΣ** ΚΑΙ ΟΙ **ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΕΣ**

Οι σταθερές αποτελούνται από 2 κυλίνδρους από ειδικό βιο-υλικό που τοποθετούνται μέσα στα 2 σπραγγώδη σώματα.



Στις διογκούμενες, οι κύλινδροι είναι συνδεδεμένοι με σύστημα αντλίας που δίνει τη δυνατότητα πλήρωσης των κυλίνδρων με φυσιολογικό ορό. Δίνουν άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά έχουν υψηλό κόστος.

Πιθανότητα μηχανικής βλάβης

Η τοποθέτηση της πρόθεσης γίνεται με χειρουργική επέμβαση διάρκειας 1 ώρας

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Η ικανοποίηση των αντρών και των συντρόφων ξεπερνά το **90%**

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ:

Σπάνιες, με πιο σημαντική τη μόλυνση της πρόθεσης (χρήζει άμεσης χειρουργικής αφαίρεσης και τοποθέτηση νέας)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΣΤΥΣΗΣ

	ΒΑΡΔΕΝΑΦΙΛΗ	ΣΙΛΔΕΝΑΦΙΛΗ	ΤΑΔΑΛΑΦΙΛΗ	ΑΛΠΡΟΣΤΑΔΙΛΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ	Από το στόμα ή διαλυόμενα δισκία στο στόμα	Από το στόμα	Από το στόμα	Ενεση στο πέος
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	mg 10 & 20	mg 25, 50 & 100	mg 5, 10 & 20	μg 20
ΜΕΓΙΣΤΗ συνήθης χορηγούμενη δόση ημερησίως (σε mg)	mg 20	mg 100	mg 20	μg 40
Συνήθης χρόνος από λήψη μέχρι να δράσει (σε ώρες)	ώρες περίπου 1	ώρες περίπου 1	ώρες 1-2	ώρες 0,2
Συνήθης διάρκεια δράσης από λήψη (σε ώρες)	6 έως 12	6 έως 12	έως 36	1 έως 2
Χρειάζεται σεξουαλικός ερεθισμός;	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ

ΠΗΓΗ: Hatzichristou D. Erectile Dysfunction. In V. Mirone: Uroandrology, Springer, 2014

Επισκεφθείτε το

www.imop.gr

και ενημερωθείτε για τα **ΣΞΞΟΥΑΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ** και τις λύσεις τους



www.facebook.com/imop.gr



www.twitter.com/imop.gr



linkedin.com/in/imop.gr



youtube.com/imopgr



google.com/+imopgr



GREEK INFOGRAPHICS